



**Ատոմներենայի դեղարկղիկի
ուղեցոյց**

Անհատական դեղատուփ

	Անուանում	Նշանակություն	Ազտագործման կարգ	Հակացուցում
Ցաագրկող	Իբուպրոֆեն	Գլխացաւ, միգրէն, ատամի ցաւ, նեարոլային եւ մկանային ցաւեր, ողնաշարի եւ յաւերի ցաւեր, բարձր Ջերմութիւն	Արական մինչեւ 3 անգամ, 400-600մգ ուտելուց յետոյ, 6-8 ժամեայ դադարով	Ստամոքսաբորբ, խոցային հիանդութիւն, Աղերգիայ
	Կետորոլակ	Ուժեղ ցաագրկող	Խմել 12 ժամը մեկ անգամ	Ստամոքսային խնդիրների դէպքում ցանկալի չէ ազտագործել:
	Պարացետամոլ	Ցաագրկող (մեղմ ցաւերի դէպքում), ջերմիջեցնող, հակաբորբոքային	Խորհուրդ տրուող միանուագ ազտագործման չափաբաժինը 10-15մգ/կգ է: Չի թոյլատրուում գերազանցել արական չափաբաժինը՝ 60մգ/կգ: Ընդունումների միջեւ ընկած ժամանակահատուածը կախուած է ախտաբանութիւնից եւ արական առաւելագոյն դեղաչափատրումից	Որովայնի ցաւեր, աղերգիայ տուեալ դեղամիջոցի հանդէպ, երիկամների կամ լեարդի խնդիրներ

Անհատական դեղատուփ

	Անուանում	Նշանակություն	Աւգտագործման կարգ	Հակացուցում
Փորացալ	Դուֆալակ	Աւգտագործել փորկապուօթեան դէպքում	Կարելի է ընդունել մեկ անգամ՝ ամբողջ չափաբաժինը կամ մասնակի: Յետագայ դեղաչափը կարող է իջեցունել՝ կախուած հիանդի կարիքներից: Մեծահասակներ՝ 15-45մլ արական 7-14 տարեկան երեխաներ՝ 15/10մլ արական 3-6 տարեկան երեխաներ՝ 5-10մլ արական 3 տարեկանից փոքր երեխաներ՝ 5/5մլ արական	- Գալակտոզեմիայ, աղիների անանցանելիութիւն, ստամորսաղիքային թափածակում, դեղամիջոցի բաղադրիչների հանդէպ գերզգայնութիւն, գալակտոզայի եւ ֆրուկտոզայի հանդէպ անհանդուրժողականութիւն - 3 տարեկանից փոքր երեխաներին աւգտագործել միայն բժշկի ցուցմամբ
	Ակտիացուած ածուխ	Վքնածութիւն, այրոց, սննդային եւ այլ թունատորմներ	1 հար իւրաքանչիւր 10կգ քաշի հաշուարկով: Արինակ՝ 50կգ քաշի պարագայում պէտք է ընդունել 5 հար: Ակտիացուած ածուխը պէտք է ընդունել ուտելոց առաջ կամ յետոյ: Արուայ ընթացքում կարելի է ընդունել ոչ աւելի, քան 4 անգամ՝ հաշուի առնելով Դեղաչափը:	Ակտիացուած ածուխի աւգտագործումը հակացուցուած է թթուներով, հիմքերով կամ նաթային պրոդուկտներով թունատորման դէպքում:
	Իմոդիում	Փորլուծութեան դէմ	Արական 2 պատիճ, առաւելագոյնը՝ մինչեւ 6 Պատիճ	- աղիքային խանգարում, փորկապութիւն, փքուածութիւն, սուր դիզենտերիայ, սուր խոցային կոլիտ - մինչեւ 4 տարեկան երեխաներ - յիլութեան I եռամսնակ

Անհատական դեղատուփ

	Անուանում	Նշանակություն	Աւգտագործման կարգ	Հակացուցում
Փորագալ	Մեզիմ ֆորտե	Ստանդրային փրուածութեան ժամանակ	Մեծահասակներին ընդունել 1-2 հաբ՝ ուտելու ընթացքում, արական մինչեւ 3 անգամ	Մեզիմ ֆորտե 10000-ը հակացուցում է դեղանիւթի հանդէպ գերզգայնութիւն ունեցող անձանց, մինչեւ 3 տարեկան երեխաներին:
Հակաաղերգիկ	Տավեգիլ	Առաջին խմբի հակաաղերգիկ է, ունի քնաբեր յատկութիւն:	Մեծահասակներին եւ 12 տարեկանից մեծ երեխաներին ընդունել 1 հաբ՝ արական 2 անգամ, Առաւուտեան եւ երեկոյեան	Հակացուցում է յոիններին եւ կերակրող մայրերին, ինչպէս նաեւ այն անձանց, ում աշխատանքը ուշադրութիւն է պահանջում:
Կոկորդի ցալ	Ստրեպսիս	Կոկորդի ցալի ժամանակ, բերանի խոռոչի, կոկորդի, վարակիչ եւ բորբոքային հիւանդութիւններին՝ տոնզիլիտ, փարինգիտ, լարինգիտ, բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի եւ լնդերի բորբոքում (ափսոզ ստոմատիտ, գինգիվիտ)	Պահել բերանում՝ մինչեւ հալուի: Ընդունել իրաքանչիւր 2 ժամը մեկ 1 հաբ, առաւելագոյն արական չափաքաժինը՝ 8 հաբ, 5 տարեկանից մեծ երեխաներին՝ 1 հաբ 4 ժամը մեկ, ընդունելուց յետոյ 30 րոպէ շարունակ ջուր չխմել:	Հինգ տարեկանից փոքր երեխաներ
Մրսածութիւն	Վիետնամական բալզամ (աստիլակ)	Գրիպի, հարբուխի, գլխացաւի, մրսածութեան, միջատների խայթոցի ժամանակ, շնչառութիւնը բացելու, մկանները տաքացնելու համար	Դեղամիջոցը կիրառում է փոքր քանակութիւններով՝ քսելով մաշկի առանձին հատուածների վրայ. - գլխացաւ՝ ճակատի եւ գլխի յետեւի շրջանում - հարբուխ՝ քթանցքների Տակ մրսածութիւն՝ կրծքավանդակի, մէջքի, որովայնի շրջանում - միջատների խայթոց՝ խայթոցի հաստաձում	Աղերգիպ դեղորայքի կամ յոտերի նկատմամբ: Նախատեսուած է միայն արտաքին աւգտագործման համար: Խոսափել աչքերի, լորձաթաղանթների, բաց Վերքերի վրայ կիրառումից:

Անհատական դեղատուփ

	Անուանում	Նշանակություն	Աւգտագործման կարգ	Հակացուցում
Իմունիտետ	Վիտամին C	Մրսածուփեան, գրիպային վիրուսների Ախտանիշների դէպքում	Աւգտագործել ուտելուց յետոյ:	Ստամոքսային հիանդոսիներ, աղերգիայ, անհանդուրժողականութիւն ասկորբինաթթուի նկատմամբ
Արտխառնոց	Դրամինա	Ճանապարհային սրտխառնոցի Դէպքում	3-6 տարեկան երեխաների պարագայում կիսել, 6-ից բարձր տարիքի անձանց կարելի է խմել ամբողջական հաբ, ցուցուած է կիրառել 1-2 հաբ արուայ ընթացքում	Ընկնաորութիւն, սուր եքսուդատիւ եւ վեգիկուղեար դերմատոզներ; մինչեւ 3 տարեկան երեխաներ, յղիութիւն; կաթնարտադրութեան շրջանը, գերզգայունութիւն դեղամիջոցի բաղադրիչների նկատմամբ
Հանգստացնող.	կատուախոտի դեղահաբեր (վալերիանա)	Աւգտագործել Նեարդային լարուածութեան, սրտամկանի յաճախակիութեան Դէպքում:	12 տարեկանից բարձր անձանց համար, 1 հաբ, աւրական 2-3 անգամ	Զգայունութիւն կատուախոտի նկատմամբ

Անհատական դեղատուփ

	Անուանում	Նշանակություն	Ազտագործման կարգ	Հակացուցում
Աչքերի չորություն	աչքի կաթիլներ, բնական արցունք	Ազտագործում է եղջերաթաղանթը խոնաեցնելու համար՝ տարբեր գործունեությամբ պայմանատրուած աչքերի չորության դեպքում, կանխում է լորձաթաղանթների գրգռումը եւ աչքի եղջերաթաղանթի Անհանգստությունը:	Աչքի կաթիլները պետք է կաթեցնել արցունքապարկի խոռոչում, 1-2 կաթիլ: Կիրառման առաջարկուող յաճախականությունը կախուած է հիանդության ծանրությունից եւ կարող է տատանուել արական 2-4 անգամ, մինչեւ տհաճ ախտանիշների ամբողջական անհետացումը:	Բարձր զգայունություն դեղամիջոցի բաղադրիչների Նկատմամբ
Վիրակապում	Մանրէազերծ վիրակապ (ստերիլ բինտ)	Կարող է հանդիսանալ որպէս վերք ծածկող սպեղանի, ինչպէս նաեւ ազտագործուել վերքը վիրակապելու համար:	Դնել ախտահանուած վերքի Վրայ:	Բացում վիճակում չպահել:
Ախտահանիչ	Բետադին	Վերքերի մշակում, ձեռքերի ախտահանում վերքերի հետ աշխատելուց առաջ եւ Յետոյ	Քսել մաշկին՝ վերքի շուրջ եւ վերքի եզրերով: Սպասել մինչեւ չորանայ, յետոյ նորից քսել: Քիչ սպասել եւ ծածկել մանրէազերծ վիրակապով կամ սպեղանիով:	Հիպերթիրէոզ, վահանագեղձի աղետմայ, երիկամային անբաւարարութիւն, դիթիումային դեղամիջոցների միաժամանակեայ ընդունում, Մանկական տարիք՝ մինչեւ 6 տարեկան, յղիութիւն, կաթնարտադրութեան շրջան, գերզգայունութիւն դեղամիջոցի բաղադրիչների նկատմամբ

Անհատական դեղատուփ

	Անուանում	Նշանակություն	Ավտագործման կարգ	Հակացուցում
Ախտահանիչ	Ախտահանիչ, բժշկական Սպիրտ	Կարող է ավտագործուել մաշկը կամ տարբեր իրեր ախտահանելու Նպատակով:		Չի կարելի խմել
	Ախտահանիչ, Ջրածնի Պերօքսիդ 3% (Պերեկիս)	Ավտագործուում է բաց վերքերի դէպքում, ողողումներ կատարելիս, կիրառուում է բերանաբորբի, անգինայի ժամանակ: Կարելի է փոխարինել 0.05% Հեքսիլոքոլ (Քլորիեքսիդին):	Արտաքինից մաշկի ու լորձաթաղանթի վնասումած հատուածները մշակում են հեղուկի մէջ թրջուած վիրակապով: Ողողման համար 1 ճաշի գդալ հեղուկը լուծել 1 բաժակ ջրի մէջ:	Գերզգայունութիւն ջրածնի պերօքսիդի նկատմամբ, աղերգիկ Ռեակցիաներ
Գոյք	Ջերմամեկուպիչ Ծածկոց	Տուժածին տեղափոխելու, մրսող մարդուն ծածկելու, պարուրելու համար:	Մարմնի ջերմաստիճանի անկման դէպքում արծաթագոյն հատուածով փաթաթել տուժածին, իսկ մարմնի ջերմաստիճանի բարձրացման (արեւային հարուածի) դէպքում՝ ոսկեգոյն մասով:	Եթէ մարմնի վրայ տեղադրուած է լարան(ներ), ապա այդ հատուածները պէտք է բաց թողնել, որ տեսանելի լինեն:

Անհատական դեղատուփ

	Անուանում	Նշանակություն	Աւգտագործման կարգ	Հակացուցում
Գոյք	Լարան (Էսմարխի լարան, Տուրնիկետ)	Զարկերակային Արինահոսություն	Զարկերակային արինահոսության դեպքում լարանը տեղադրելուց յետոյ այն կարող է հանել միայն բժիշկը: Դնելուց յետոյ անպայման տեսանելի հատուածում (ճակատ, այտ) գրել դնելու ժամը: Համոզուելու համար, որ լարանը ճիշտ է դրուած, պէտք է ստուգել զարկերակը. զարկեր պէտք է չզգացուեն:	Առողջ մարդու մարմնին չի կարելի լարան դնել, փորձարկել կարելի է մի քանի վայրկեան, չի կարելի լարանը դնել սրունքին եւ Նախաբազկին:
	Առածգական վիրակապ (էլաստիկ բինտ)	Փաթաթում եւ ցուցեցրած վերջոյթին՝ շարժումները որոշ չափով սահմանափակելու Համար:	Երակային արինահոսութեան դեպքում դնել որեւէ մաքուր կտոր կամ միջադիր, այնուհետեւ, ամուր ձգելով վիրակապել արինահոսող հատուածը, իսկ զարկերակայինի դեպքում՝անել տամպոնադա, այնուհետեւ՝ ամուր ձգելով վիրակապել:	Յարգացաւերի դեպքում չկապել շատ ծիգ՝ վերջոյթի բնականոն արեան շրջանառութիւնը չխաթարելու համար:
	Կպչուն բժշկական ժապաւէն	Նախատեսուած է սպեղանին վերքի վրայ փակցնելու համար:		Արգելուում է փակցնել վերքի վրայ ստանց սպեղանիի առկայութեան:
	Միջադիր	Բացի առաջնային նպատակից՝ կարող է կիրառուել երակային եւ մազանաւթային արինահոսութեան դեպքում, կարող է դրուել կաշիկի մէջ՝ որպէս ներդիր՝ ոտքերը վերքերից պաշտպանելու, եւ խոնաւ ժամանակ չոր պահելու համար:	Բացել եւ բամբակային հատուածով դնել վերքի վրայ: Որպէս ներդիր՝ բացել եւ սոսնձային հատուածով փակցնել Կոշիկի ներդիրին:	Նոյն միջադիրը աւգտագործել միայն 1 անգամ:

Անհատական դեղատուփ

	Անուանում	Նշանակություն	Աւգտագործման կարգ	Հակացուցում
Գոյք	Սառցէ պարկ	Հարուածի դէպքում ցանցրած հատուածին դնելու համար, արհիւնահոսութիւնը (ներքին կամ քթից) դադարեցնելու Համար:	Հետեւել պարկի վրայ գրուած ցուցումներին	Չաւգտագործել՝ առանց մաշկի վրայ կտոր դնելու: Նախատեսուած չէ ներքին աւգտագործման Համար:
	Անուշադրի Սպիրտ	Ուշաթափութեան ժամանակ, միջատների (կրետ, մեղու, կարիճ) եւ աձերի խայթոցի ժամանակ	Մատեցնել քթին եւ պահել 5-15սմ հեռաւորութեան վրայ:	Գերզգայունութիւն ալտիւ նիւֆի նկատմամբ: Արտաքին աւգտագործման պարագայում՝ մաշկային հիւանդութիւններ (ներառեալ դերմատիտ, եկզեմայ)

«Առաջին անհրաժեշտությունների հաւաքածու», Ճապոնիա

<https://itsyourjapan.com/emergency-earthquake-bag/>



«Տագնապի ճամպուրակ», Ռուսաստան

<https://dzen.ru/media/frontiersurvival/emergency-kit-ili-trevojnyi-chemodanchik-chast-1-5aedf6bd00b3dd64a60f1ee4>



«Գոյատեւման հաւաքածու», Կարմիր խաչ

<https://www.redcross.org/get-help/how-to-prepare-for-emergencies/survival-kit-supplies.html>



Գոյատեւման տարրեր հաւաքածուներ, ԱՄՆ

<https://theprepared.com/bug-out-bags/guides/bug-out-bag-list/>

